

ワンサイドP乳剤
(フルアジホップP乳剤)

登録番号: 第20123号

適用拡大の概要

<適用地帯の区分が廃止となったことによる変更>

・適用地帯の欄を削除する。

<使用方法の変更>

・作物名「だいず」「えだまめ」「あずき」「いんげんまめ」「にんじん」「だいこん」「てんさい」「たまねぎ」「トマト」「かんしょ」「ばれいしょ」「キャベツ」「アスパラガス」「やまのいも」「にんにく」「ブロッコリー」「せんきゅう」の使用
方法「雑草茎葉散布」を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。

・「いぐさ」の使用方法「雑草茎葉散布(落水)」を「雑草茎葉散布又は全面散布(落水)」に変更する。

【変更後】

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルアジホップを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
だいず			雑草生育期(イネ科雑草8~10葉期)但し、収穫60日前まで	100ml/10a	100L/10a	1回	<u>雑草茎葉散布又は全面散布</u>	1回
			雑草生育期(イネ科雑草5~8葉期)但し、収穫60日前まで		通常散布50~100L/10a 少量散布25~50L/10a			
			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫60日前まで	75~100ml/10a				
えだまめ	-	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)シバムギレッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草5~8葉期)但し、収穫30日前まで	100ml/10a	通常散布50~100L/10a 少量散布25~50L/10a	1回	<u>雑草茎葉散布又は全面散布</u>	1回
			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫30日前まで					
あずき			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫60日前まで	75~100ml/10a	通常散布50~100L/10a 少量散布25~50L/10a	1回	<u>雑草茎葉散布又は全面散布</u>	1回
いんげんまめ			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫45日前まで					
にんじん			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫30日前まで	50~100ml/10a	70~100L/10a	1回	<u>雑草茎葉散布又は全面散布</u>	1回
だいこん			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、収穫45日前まで					

次ページに続く

ワンサイドP乳剤
(フルアジホップP乳剤)

登録番号: 第20123号

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルアジホップPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
てんさい	-	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く) シバムギ レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~8葉期)但し、 収穫90日前まで	75~ 100ml /10a	70~ 100L/10a	1回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1回	
たまねぎ			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫30日前まで						
いちご (親株床)			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫後~定植まで	50~ 100ml /10a					
トマト			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫21日前まで	75~ 100ml /10a					
かんしょ			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫60日前まで	50~ 75ml /10a					
ばれいしょ			雑草生育期(イネ科雑草3~8葉期)但し、 収穫前日まで	75~ 100ml /10a					
キャベツ		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫30日前まで	100L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布		2回以内		
アスパラガス		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫前日まで	50~ 100ml /10a						70~ 100L/10a
やまのいも		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫30日前まで							
にんにく		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)但し、 収穫21日前まで	100L/10a						

次ページに続く

ワンサイドP乳剤
(フルアジホップP乳剤)

登録番号: 第20123号

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルアジホップPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
ブロッコリー	-	一年生イネ科雑草(スズメカササグを除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、 収穫30日前まで	50~100ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回	
せんきゅう			雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、 収穫90日前まで						
かんきつ		春季~夏季 雑草生育期 (草丈20cm以下) 但し、 収穫120日前まで	200~300ml/10a	雑草茎葉散布					
		チガヤ、ススキ等の多年生イネ科雑草			春季~夏季 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、 収穫120日前まで		300~500ml/10a		
いぐさ		水田一年生イネ科雑草	落水後 (雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期))	100~200ml/10a	100~150L/10a				雑草茎葉散布 又は 全面散布 (落水)
桑		一年生イネ科雑草(スズメカササグを除く) シハムギ レットトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)	75~100ml/10a			2回以内		
つつじ類 つばき類 とちのき さくら まつ しゃりんばい			雑草生育期(草丈20cm以下)	100~200ml/10a					
日本芝		ベントグラス	雑草生育期(芝休眠期)	150ml/10a	1回		散布		1回

次ページに続く

ワンサイドP乳剤
(フルアジホップP乳剤)

登録番号: 第20123号

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルアジホップPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生 イネ科雑草 キシュウスズメヒエ	雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、 収穫120日前まで	200~ 400ml /10a	100~ 150L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	1回
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地の り面等	一年生 イネ科雑草 (スズメカビラ を除く)	雑草生育期 (草丈20cm以下)	150~ 300ml /10a	100L/10a	3回 以内	植栽 地を 除く 樹木 等の 周辺 地に 雑草 茎葉 散布	3回 以内
		多年生 イネ科雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	400~ 600ml /10a	150L/10a			

＜使用上の注意事項の変更・追加＞以下を追加する。
・雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布すること。