

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<適用病害虫の追加>

・作物名「てんさい」の適用病害虫名に「褐斑病」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「てんさい」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布は4回以内)」から「5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内)」に変更する。

<使用方法の追加>

・作物名「キャベツ」の適用病害虫名「苗立枯病(リゾクトニア菌)」に使用方法「全面土壌散布」を追加する。

(**下線部**が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病	1000倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	5回以内 (は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、 株元散布及び散布 は合計4回以内)
	根腐病	1000～2000倍				株元散布	
	黒根病	1000倍				苗床土壌灌注	
		100倍	3L/m ²	移植前	1回		

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
キャベツ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病 根こぶ病	500mL /10a	100～200 L/10a	は種又は定植前	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)	全面散布 土壌混和	3回以内 (苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病			定植前	1回	全面土壌散布	
	株腐病		150～200 L/10a				

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし