

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

適用拡大の概要

<使用方法の追加>

- ・作物名「はくさい」の適用病害虫名「菌核病」の使用方法に「散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の適用病害虫名「菌核病」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
はくさい	黒斑病 白斑病	2000～ 4000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内 (灌注は 1回以内)
	菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または、ペー パーポット1冊(約 30×60cm、使用 土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	苗立枯病 (リゾクトニア菌)						
キャベツ	株腐病 根朽病	2000～ 4000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布 無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は 1回以内)
	菌核病	16倍	1.6L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 根朽病	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または、ペー パーポット1冊(約 30×60cm、使用 土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	2000～ 4000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布 無人航空機 による散布	3回以内
		16倍	1.6L/10a				
		32倍	3.2L/10a				

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

以下の注意事項を追加する。

- ・無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ①散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - ②散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ④散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ⑤散布終了後は次の項目を守ること。
 - (a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理すること。
 - (b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。