



適用拡大
カリフラワー



〈写真はイメージです〉

害虫防除へ
パワー全開!!



殺虫剤

アクセル[®] **フロアブル**

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!



ハスモンヨトウ

オオタバコガ

タマナギンウワバ

コナガ

ハイマダラノメイガ

キスジノミハムシ

ヨツモンカメノコハムシ

カブラハバチ

ゴマダラカミキリ

クビアカツヤカミキリ

適用作物

- | | | |
|-------------------|----------|------------|
| ● うめ | ● だいこん | ● なす |
| ● かんきつ | ● かぶ | ● 食用ミニバラ |
| ● キウイフルーツ | ● ねぎ | ● しょうが |
| ● キャベツ | ● ほうれんそう | ● かんしょ |
| ● はくさい | ● アスパラガス | ● さといも |
| ● レタス | ● えだまめ | ● にんじん |
| ● 非結球レタス | ● だいず | ● ごぼう |
| ● ブロッコリー | ● とうもろこし | ● 花き類・観葉植物 |
| ● カリフラワー | ● トマト | ● 樹木類 |
| ● 非結球あぶらな科
葉菜類 | ● ミニトマト | ● たばこ |
| | ● ピーマン | |



特長

- 1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効!
- 2 害虫からの食害を停止させます!
- 3 ローテーション防除に活用しやすい!

適用病害虫および使用方法

が2021年12月に適用拡大になりました。

<2021年12月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5～200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ	1000～2000倍	200～700ℓ/10a				
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍		100～300ℓ/10a			
うめ	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ		1000～2000倍				
とうもろこし	アワノメイガ	1000倍		100～800ℓ/10a			
アスパラガス	ツマジロクサヨトウ		1000～2000倍				
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000倍		100～300ℓ/10a			
トマト、ミニトマト	ヒョウタンゾウムシ類		1000～2000倍				
ピーマン	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍					
なす	オオタバコガ		1000～2000倍				
にんじん	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ	1000倍					
ねぎ	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類		1000倍				
ほうれんそう	シロイチモジヨトウ	1000～2000倍			2回以内	散 布	2回以内
	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ		1000～2000倍				
キャベツ	ウリハムシモドキ	1000倍			3回以内		※2
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ		1000～2000倍				
	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ	8倍					
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類		1.6ℓ/10a				
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	1000倍		100～300ℓ/10a	散 布		2回以内
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類		1000～2000倍				
レタス	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ	1000倍			2回以内		散 布
非結球レタス	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ		1000～2000倍				
ブロッコリー	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000倍			1.6ℓ/10a		2回以内
	コナガ		8倍				
カリフラワー	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	1000倍			100～300ℓ/10a	2回以内	散 布
	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ		1000倍				
非結球	コナガ、キスジノミハムシ	2000倍			100～300ℓ/10a	2回以内	2回以内
あぶらな科葉菜類	ハスモンヨトウ		1000倍				
だいこん	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ	1000～2000倍			100～300ℓ/10a	2回以内	2回以内
かぶ	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ		1000倍				
えだまめ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000～2000倍		1000倍	2回以内	2回以内	
	だいず		ハスモンヨトウ				1000～2000倍
しょうが	フタスジヒメハムシ	1000～2000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	※2		
	ハスモンヨトウ、アワノメイガ					16倍	
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	10～16倍	0.8～1.6ℓ/10a	3回以内	※2		
	ヨツモンカメノコハムシ					1000～2000倍	
さといも	ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	発生初期	散 布		
食用ミニバラ	オオタバコガ					1000倍	
きく	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍	200～700ℓ/10a	6回以内	6回以内		
花き類・観葉植物(きくを除く)	オオタバコガ					1000倍	
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	1000～4000倍	200～700ℓ/10a	6回以内	6回以内		
さくら	クビアカツヤカミキリ					1000倍	5～200ℓ/10a
	200倍	—	※3				
	100倍						
たばこ	ヨトウムシ	1000～2000倍	25～180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散 布	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍					

※1:主幹から株元に散布 ※2:無人航空機による散布 ※3:木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害源である木屑排出孔の木屑を除去した後排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にからないようにしてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種に準拠した散布装置を使用してください。
 - ②散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。

- ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ④散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手洗、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

<取扱い>



石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

 ホームページ アドレス <https://ibj.iskweb.co.jp>