

殺菌剤

ランマンPフロアブル



殺菌剤分類

21

農林水産省登録	第22113号
有効成分	シアゾファミド・・・・・・・・・・9.4% (w/w) [10.0% (w/v)]
性状	淡褐色水性和性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	1L × 5本

特長

- ✓ ピシウム菌にすぐれた効果
病原菌の菌糸生育を低濃度で阻害し、ピシウム菌に特異的に高い防除効果を示します。
- ✓ すぐれた残効性
残効性にすぐれ、2週間程度の間隔で散布が可能です。
- ✓ 次世代菌密度低減効果（サニテーション効果）
孢子（遊走子）の形成阻害効果により次世代孢子形成を阻害し、次世代病原菌密度を低減します。
- ✓ 耐性菌に有効
既存剤とは異なる作用機作を有するのでフェニルアマイド系などの薬剤耐性菌に対し有効です。
- ✓ 安全性・耐雨性にすぐれる
ベントグラスに対する安全性にすぐれています。散布後乾けば、降雨があっても安定した効果が得られます。

適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	1㎡当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シアゾファミド を含む農薬の総 使用回数
芝 (ペントグラス)	ビシウム病 赤焼病	200倍	0.1 ℓ	発病初期	6回以内	散布	6回以内
		400倍	0.2 ℓ				
		1000倍	0.5 ℓ				

※本内容は2017年1月25日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 予防効果主体の剤なので、発病初期に散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 散布器具の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないよう安全に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意すること。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では該当がない。

保管

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。