



ネマトリンパワーD粒剤



殺虫剤分類

4A,1B

農林水産省登録	第24555号
有効成分	クロチアニジン・・・0.15% ホスチアゼート（化管法 1種）・・・1.5%
性状	類白色～淡褐色細粒
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	20kg×1袋

特長

✓ 2つの問題害虫をまとめて防除
1回の散布・混和で「ネコブセンチュウ」と「コガネムシ幼虫」をしっかり防除します。

✓ 全面土壌混和・作条土壌混和のどちらも使用可能

✓ 簡便な作業性で省力化に貢献
ガス抜き作業が不要で、作業労力を軽減できます。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	ホスチアゼートを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ネコブセンチュウ コガネムシ類	20～30kg	植付前	1回	全面土壌混和	3回以内 （植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内）	2回以内 （苗床は1回以内、本圃は1回以内）
		20kg			作条土壌混和		

※本内容は2021年10月27日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 散布が不均一だったり、混和が不十分だと効果不足や薬害を生じることがあるので注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- ホスチアゼートの解毒剤としては動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されている。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では該当がない。

保管

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。