



アクセルフロアブル



農林水産省登録

第22461号

有効成分

メタフルミゾン · · · · · 25.0%

その他化管法該当成分

ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種) 1.3%

性状

類白色水和性粘稠懸濁液体

人畜毒性

普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限

4年

包装

500mL × 20本

殺虫剤分類

22B

特長

✓ 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効

難防除害虫の大型チョウ目やキスジノミハムシにも優れた効果を発揮します。

✓ 害虫からの食害を停止させます

作物への食害を抑制するため、きれいな作物の生産に役立ちます。

✓ ローテーション防除に活用しやすい

新しい化学構造の殺虫剤なので、既存剤抵抗性害虫にも有効です。そのため、ローテーション防除に組み入れやすい薬剤です。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	希釗倍数	10アール当たり使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ	収穫7日前まで	3回以内	主幹から株元に散布	3回以内
		1000~4000倍				散布	
	アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ	1000~2000倍	200~700ℓ			無人航空機による散布	
	ゴマダラカミキリ	12倍	4~8ℓ		2回以内	散布	
		15倍	8~10ℓ			樹幹散布	
	アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ	24倍	10~16ℓ				
	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ		3回以内	散布	
	クビアカツヤカミキリ	1000倍				樹幹散布	
		100~200倍	5~200ℓ				
キウイフルーツ	ケムシ類			100~300ℓ	3回以内		3回以内
もも類 すもも	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ	1000倍	200~700ℓ			散布	
		100~200倍	5~200ℓ			樹幹散布	
うめ	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ	1000倍	200~700ℓ			散布	
とうもろこし 飼料用とうもろこし（子実）	アワノメイガ	1000~2000倍				全面土壌散布	
	ツマジロクサヨトウ	1000倍	100~300ℓ				
アスパラガス	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~800ℓ		2回以内		2回以内
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000~2000倍				散布	
	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍					
トマト ミニトマト	トマトキバガ						
	オオタバコガ ハスモンヨトウ						
ピーマン	オオタバコガ			100~300ℓ	3回以内		3回以内
なす	オオタバコガ ニジュウヤホシテントウ ハスモンヨトウ	1000~2000倍				散布	
		1000倍					
にんじん	ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類	1000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	100~300ℓ		2回以内	散布	2回以内
		8倍	1.6ℓ			無人航空機による散布	
		10倍	2ℓ				
		16倍	3.2ℓ				
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ	1000~2000倍		100~300ℓ	3回以内		3回以内
	ウリハムシモドキ						
	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000倍					
	ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ	1000~2000倍			2回以内	散布	

キャベツ	オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類			収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
	コナガ	8倍	1.6 ℥				
	アオムシ	10倍	2 ℥				
	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類	16倍	3.2 ℥				
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメ イガ キスジノミハム シ ダイコンハムシ	1000倍	100~300 ℥	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	1000~2000倍					
	コナガ アオムシ キスジノミハム シ ダイコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	8倍 10倍 16倍	1.6 ℥ 2 ℥ 3.2 ℥				
	レタス	1000~2000倍 8倍 10倍 16倍	100~300 ℥ 1.6 ℥ 2 ℥ 3.2 ℥			無人航空機による散布	3回以内
	非結球レタス	1000~2000倍 8倍 10倍 16倍	100~300 ℥ 1.6 ℥ 2 ℥ 3.2 ℥				
	カリフラワー	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000倍		2回以内	散布	2回以内
	プロッコリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ	1000~2000倍 1000倍 8倍 10倍 16倍				
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ キスジノミハム シ	1000倍	100~300 ℥	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					
	だいこん	キスジノミハム シ ダイコンハムシ ハイマダラノメ イガ ヨトウムシ カブラハバチ類	1000倍 1000~2000倍				
かぶ	コナガ アオムシ キスジノミハム シ	1000倍	100~300 ℥	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ フタスジヒメハ ムシ	1000~2000倍 1000倍					
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	1000~2000倍 16倍	3.2 ℥				
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノ	10~16倍	0.8~1.6 ℥	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内

	コハムシ	1000~2000倍	100~300ℓ	発生初期	6回以内	散布	6回以内
さといも 食用ミニバラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000倍					
きく	オオタバコガ シロイチモジヨ トウ	1000~2000倍					
花き類・観葉植 物 (きくを除く)	オオタバコガ	1000倍					
樹木類 (さくらを除 く)	ケムシ類	1000~4000倍	200~700ℓ	成虫発生直前～ 成虫発生期		主幹から株元に 散布	6回以内
さくら	ケムシ類	1000倍					
	クビアカツヤカ ミキリ	200倍					
		100倍					
たばこ	ヨトウムシ タバコアオムシ	1000~2000倍 2000倍	25~180ℓ	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内

※本内容は2024年12月11日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 敷布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- 本剤をクピアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- うめに全面土壤散布する場合は、過度な降雨等により土壤に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさけてください。
- すももに樹幹散布で使用する場合、散布液が果実にかかると汚れを生じるおそれがあるので、果実にからないように十分注意してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ・散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - ・散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ・散布薬液の飛散によって自動車やカラートンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ・散布終了後は次の項目を守ってください。
 - 1.使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - 2.機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項



- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも使用当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱およびその周辺にかかるないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

保管

密栓し、直射日光を避け、食品と区別して冷涼な所に保管してください。