



ウララ50DF



殺虫剤分類

29

農林水産省登録	第21813号
有効成分	フロニカミド・・・・・・・・・・ 50.0%
性状	淡褐色水和性細粒
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	50g × 20袋 × 2函

特長

- ✓ アブラムシ類に高い効果
アブラムシ類、アザミウマ類に対して高い殺虫効果があります。
- ✓ ユニークな作用
対象害虫の吸汁を速やかに阻害して防除します。対象害虫が衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は即効的で直ちに加害できなくなります。
- ✓ すぐれた残効性と耐雨性
葉内で適度な安全性を持ち、2～3週間の残効性があります。また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後すみやかに葉内に取り込まれるため、降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
- ✓ 新しい系統の殺虫剤
新規な作用性を持ち、IRM（抵抗性害虫管理）のローテーション防除に最適な殺虫剤です。
- ✓ 高い浸透移行性・浸達性
高い浸透移行性を持っているため、巻葉を作り薬剤のかけ難いアブラムシの防除が可能です。上位展開葉や新梢にも薬剤が移行します。
- ✓ 天敵や有用昆虫に対し、影響が少ない
カブリダニ類、寄生蜂などの天敵に影響が少なく、IPM（総合的病害虫管理）体系防除の一剤として適合します。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当たり 使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロニカミドを 含む農薬の総使 用回数
かんきつ（みか んを除く）	アザミウマ類	5000～10000 倍	200～700 ℓ	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	10000倍					
みかん	アザミウマ類	5000～10000 倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
	アブラムシ類	10000倍					
マンゴー	チャノキイロア ザミウマ	5000～10000 倍					
れんこん	クワイイクビレア ブラムシ	10000倍	100～300 ℓ	生育期 但し収穫14日前 まで	1回		
ばら チューリップ ゆり	アブラムシ類			発生初期	6回以内		6回以内
きく		5000～10000 倍					
カーネーション	モモアカアブラ ムシ	10000倍					

※本内容は2024年7月10日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。散布器具、容器の洗浄水等は河川等に流さないこと。周囲に影響のない方法で処理を行ない、空容器は環境に影響のないよう適切に処理すること。
- 使用量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項



- 粉末は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して、薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では該当がない。

保管

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。