

殺虫剤

トアローフロアブルCT



殺虫剤分類

11A

農林水産省登録	第20056号
有効成分	パチルス チューリングゲンシス菌の産生する結晶毒素 7.0%
性状	淡褐色水溶性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	500mL × 20本

特長

✓ BT菌の中でもコナガに対して殺虫活性の高いクスターキ株を100%使用し、その結晶毒素を7.0%含有しているので、コナガに対して確実な効果が得られます。

✓ フロアブル化により希釈液の調製が容易になるとともに、希釈液中の結晶毒素の分散性が向上し、作物に均一に付着します。

✓ 独自の製法により紫外線の影響を受けにくく、安定した効果が得られます。

✓ JASが定める有機農産物にも使用することができます。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農業の総使用回数
野菜類	アオムシ コナガ	1000～2000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—	散布	—
	オオタバコガ	500～1000倍				
のざわな	ヨトウムシ	500倍				
さくら	アメリカシロヒトリ	1000倍	発生初期		1㎡当り0.3ℓ 散布	
つばき類	チャドクガ					
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	500～1000倍				

※本内容は2016年9月23日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。
- 散布液調製時には、使用直前に容器をよく振ること。
- 使用に当たっては、展着剤を用いること。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布すること。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性の強い薬剤とは混用しないこと。
- 若齢幼虫に有効なので、若齢幼虫期に時期を失せず、散布すること。
- 蚕に対する毒性があるので、養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では使用しない。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないよう、風向きなどに十分注意して散布すること。なお、本剤の使用に当たっては、散布地域の使用規制に従うこと。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項



- 誤飲に注意すること。もし誤って飲み込んだ場合は吐きだした上、医師の診察を受けること。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では該当がない。

保管

密栓し、直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温な所で保管する。