

植物成長調整剤

ルートン



農林水産省登録	第6071号
有効成分	1-ナフチルアセトアミド 0.40%
性状	類白色粉末
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
有効年限	5年
包装	(20g × 10本) × 10函

特長

✓ 挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。
本剤を処理すると発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。

✓ 本剤1本（20g）で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200～400本程度に使用できます。

適用作物と使用方法

作物名	使用目的	本剤の使用回数	使用方法	1-ナフチルアセトアミドを含む農薬の総使用回数
林木（すぎ、ひのき、メタセコイヤ等） 庭園樹（まさき、じんちょうげ、あおき等） 花き（きく、ゼラニウム等）	挿木（挿苗）時処理して発根を促進する。	—	1) 挿木（挿苗）の基部を3cmぐらい水にひたしその部分にうすい層になって付着する程度に粉のまままぶす。 2) 或いは本剤を適当量の水でペースト状にねってから挿木の切り口にぬりつける。 日陰干で乾燥してから挿す。 この場合挿木（挿苗）にあまり多量に厚く塗布しないようにすること。 上記の方法で処理し挿しおわったら周囲に土をかけてよく固めておくこと。	—

※本内容は2018年3月16日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 食用作物には使用しないでください。
- 挿木に粉末のまま まぶす場合も、ペースト状にしてぬりつける場合も、多量につけ過ぎないように注意してください。
- すぎの挿穂の場合、処理適期は挿穂の新芽が米粒大になるまでの間に挿木することが望ましく、3~4月中旬頃が最適です。
- 本剤は植物ホルモン剤ですので、使用に際しては使用時期、使用量、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。