

* 殺菌剤

カッシーニフロアブル



殺菌剤分類

50

農林水産省登録	第24445号
有効成分	ピリオフェノン（化管法2種）・・・・・・16.5%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称）
有効年限	3年
包装	500ml×20本

特長

- ✓ うどんこ病に優れた効果
うどんこ病菌における胞子の付着器・吸器形成から菌糸伸長、胞子形成に至る各生育ステージを阻害することで、安定した防除効果を発揮します。
- ✓ マルチスプレッド効果で作物をしっかり守る
成分が速やかに葉内で拡散し、吸器形成を強く阻害することで病斑の拡大を抑え、安定した防除効果を発揮します。
- ✓ サニテーション効果（まん延防止効果）により、病害の拡大を抑える
うどんこ病の胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
- ✓ 天敵、有用昆虫に対する高い安全性
訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPM（総合的病害虫防除）に適合した薬剤です。

適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリオフェノンを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病	2000～2500倍	200～700ℓ	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
小麦		3000倍	60～150ℓ		3回以内		3回以内

※本内容は2022年8月3日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 出来るだけ発病前または発病初期に散布してください。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- りんごに使用する場合は、次の事項に注意してください。
 - ・ 落花5日後までは果そう葉に褐変を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
 - ・ 特定の品種（メイポール、メイ17など）においては強い薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

保管

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。