

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<適用病害虫名の追加>

・作物名「ブルーベリー」に適用病害虫名「根腐疫病」を追加する。

<使用方法の追加>

・作物名「りんご」の適用病害虫名「黒星病」に使用方法「落葉に散布」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「りんご」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「2回以内 (散布または落葉に散布は1回以内、
土壌灌注は1回以内)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
ブルーベリー	白紋羽病 <u>根腐疫病</u>	500倍	50～ 100L/樹	収穫21日前 まで	1回	土壌灌注	1回以内
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病 褐斑病	2000～2500 倍	200～ 700L/10a	収穫45日前 まで	1回	散布	2回以内 (散布または 落葉に散布は 1回以内、土 壌灌注は1回 以内)
	黒星病	1000～2000 倍	100～ 200L/10a	落葉後～ 展葉期まで		<u>落葉に 散布</u>	
	輪紋病 モニリア病	2000倍	200～ 700L/10a	収穫45日前 まで		散布	
	白紋羽病 紫紋羽病	500倍	50～ 100L/樹			土壌灌注	
1000倍		100～ 200L/樹					

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

以下のとおり変更、追加する。

・本剤を土壌灌注する場合は、次の事項に注意すること。

① 白紋羽病、紫紋羽病に使用する場合は、樹幹から半径1m程度の範囲を掘り上げて根部を露出させ、病根を除去した後所定濃度の薬液を灌注し埋め戻すか、半径1m程度の範囲に土壌灌注機を用いて所定量の薬液を灌注すること。但し土壌灌注機による灌注は予防的使用か軽症樹に限って行うこと。

③ 適用の範囲内で、樹の大きさにより灌注水量を調節すること。

・落葉に散布で使用する場合は、ほ場内で落葉に対して均一に散布すること。