

殺虫剤

ウララDF



殺虫剤分類

29

農林水産省登録	第21812号
有効成分	フロニカミド 10.0%
性状	淡褐色水和性細粒
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
有効年限	5年
包装	250g × 20袋 500g × 20袋

特長

- ✓ アブラムシ類に高い効果
アブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果を発揮します。特にアブラムシ類には、種に関わらず高い効果を示します。
- ✓ ユニークな作用
アブラムシの吸汁を阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかりますが、吸汁活動は速効的に阻害します。
- ✓ すぐれた残効性と耐雨性
本剤は葉中で適度な安定性を持ち、おおむね2~3週間の残効性があります。また、有効成分が植物内に速やかに取り込まれるため降雨による流亡が少なく、耐雨性にも優れています。

- ✓ 既存剤とは異なる系統の殺虫剤
既存剤のいずれとも異なる新規な作用機作を持っています。このため、既存の殺虫剤に抵抗性を示すアブラムシにも有効で、ローテーション防除に使用する殺虫剤として適しています。
- ✓ 高い浸透移行性と浸達性
高い浸透移行性と浸達性により、巻葉を作り薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも効果を発揮します。有効成分は上位展開葉や新梢にも移行します。
- ✓ 天敵・有用生物に対する安全性
カブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫に影響が少なく、IPM（総合的病害虫防除）に適した薬剤です。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロニカミドを含む農業の総使用回数
りんご	リンゴワタムシ	2000倍	200~700ℓ	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	アブラムシ類	2000~4000倍					
なし	アブラムシ類						
	チャノキイロアザミウマ	2000倍					
かき	チャノキイロアザミウマ						
	もも	アブラムシ類		2000~4000倍			
ネクタリン							
小粒核果類	アブラムシ類	2000倍					
	モモヒメヨコバイ						
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000倍		開花前まで			
	ツマグロアオカスミカメ	2000倍					
おうとう	チャノキイロアザミウマ コアオカスミカメ	2000倍	収穫前日まで				
小麦	アブラムシ類	4000倍	60~150ℓ	収穫7日前まで			
いちご		2000~4000倍					
メロン	コナジラミ類	2000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	
	きゅうり	アブラムシ類					2000~4000倍
コナジラミ類		2000倍					
なす トマト ミニトマト	アブラムシ類	2000~4000倍					
	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
ししとう	アブラムシ類	2000~4000倍			2回以内		
ピーマン							
すいか うり類（漬物用） にがうり ズッキーニ							
さやえんどう さやいんげん 実えんどう					2回以内		
かぼちゃ えだまめ いんげんまめ だいず あずき ごぼう 葉ごぼう							
アスパラガス			アブラムシ類 ネギアザミウマ	2000倍		3回以内	
セルリー ほうれんそう しゅんぎく 非結球あぶらな 科葉菜類	アブラムシ類	4000倍	収穫前日まで	2回以内			
エンダイブ すいぜんじな 食用ぎく			収穫7日前まで				
レタス 非結球レタス パセリ			収穫前日まで				
だいこん			2000~4000倍		収穫3日前まで		
未成熟とうもろ							

こし											
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリ ヒメヨコバイ	2000倍			収穫前日まで	3回以内		3回以内			
ばれいしょ	アブラムシ類	2000~4000倍	25ℓ		収穫7日前まで	2回以内		2回以内			
		500倍									
		1000倍									
さといも やまのいも やまのいも(むかご) こんにゃく	アブラムシ類	2000倍									
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000倍	100~300ℓ		収穫7日前まで	3回以内		2回以内			
ねぎ		1000~2000倍			収穫前日まで						
くわい	2000倍	収穫21日前まで									
キャベツ はくさい ブロッコリー カリフラワー	2000~3000倍	2000倍			収穫前日まで	2回以内			2回以内		
みつば	アブラムシ類	2000~4000倍			収穫14日前まで						
					収穫3日前まで 但し、伏せ込み 栽培は伏せ込み 前まで						
					収穫3日前まで						
					収穫14日前まで						
しそ おかひじき		4000倍				収穫3日前まで					
てんさい		2000~4000倍				収穫14日前まで					
食用ミニバラ		2000倍		収穫3日前まで							
きく(葉)		4000倍		収穫14日前まで							
茶	チャトゲコナジ ラミ	1000倍	200~400ℓ		摘採7日前まで	1回		1回			
	チャノキイロア ザミウマ	1000~2000倍									
	チャノミドリヒ メヨコバイ										
	ツマグロアオカ スミカメ										
	コミカンアブラ ムシ	2000倍									

作物名	適用場所	適用害虫名	10アール当り 使用量	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の使用回 数	使用方法	フロニカミド を含む農薬の 総使用回数
いちご	温室、ガラス 室、ビニール ハウス等密閉 できる場所	アブラムシ類 コナジラミ類	100g	10ℓ	収穫前日まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
トマト ミニトマト			100~150g			3回以内		3回以内

※本内容は2024年9月18日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具、容器の洗浄水等は河川等に流さないでください。周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器は環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 使用量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- きゅうりに使用する場合、徒長したものではありませんが、その後の展開葉および生育には影響はありません。
- 非結球あぶらな科葉菜類に使用する場合、低温多湿等の薬液が乾燥しにくい条件下では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- すももでは品種により、葉に薬害が生じる場合があるので注意してください。
- ばれいしょに対して少量散布で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。
- ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意してください。
 - ・専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用にあたっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
 - ・できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態にしてください。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気してから入室してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に保管してください。