

人や環境に優しい殺ダニ剤

殺ダニ剤

農林水産省登録
第20609号

アカリタッチ[®] 乳剤



ナミハダニ



ミカンハダニ



カンザワハダニ



うどんこ病



ハダニ類とうどんこ病を同時防除!

アカリタッチはOATアグリオ(株)の登録商標

ISK 石原バイオサイエンス株式会社

- 成分: プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル…70.0%
- 毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 包装: 500ml×20本(ケース)

特長

食品添加物を有効成分とする、人や環境に優しい殺ダニ剤です。

既存の薬剤に対して抵抗性が発達したハダニ類にも優れた効果を発揮します。

物理的に作用するため、抵抗性の発達するおそれは少ないと考えられます。

天敵、訪花昆虫に対する影響が少ない殺ダニ剤です。

収穫前日まで散布可能で、使用回数制限がありません。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(10a当り)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数
野菜類	ハダニ類	1000~3000	100~400ℓ	収穫前日まで	—	散布	—
	うどんこ病	2000					
果樹類(りんごを除く)	ハダニ類	1000~3000	200~700ℓ				
	りんご	うどんこ病					
ホップ	ハダニ類、うどんこ病	2000	100~400ℓ				
いも類	ハダニ類	2000~3000	100~400ℓ				
	うどんこ病	2000					

2024年9月現在の登録内容

上手な使い方と使用上の注意

- ★野菜類・果樹類のハダニ類対象には2000~3000倍希釈で、うどんこ病対象には2000倍希釈で、葉裏までていねいに散布してください。(効果・薬害)
- ★散布液が溜まるような状態では、油浸状・茶褐色の薬害(いちごの果実等)が発生することがありますので、薬液の乾きやすい時に登録の範囲内の少ない散布量で散布してください。(薬害)
- ★高温時や日射の強い時間帯または寒暖の差が激しい時期の散布はさけてください。(薬害)
- ★展着剤は加用しないでください。散布は本剤の単用散布でお願いします。(効果・薬害)

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製に際してはよくかき混ぜ、調製後はなるべく早く使用してください。
- 散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、害虫にムラなくかかるよう、葉の表裏へていねいに十分散布してください。
- 害虫の卵には効果がなく、また残効性が期待できないので、害虫の増殖や圃場からの飛び込みが活発なときには、5~10日間隔で連続2回散布や、他剤とのローテーション散布をしてください。
- かんきつに使用する場合、濃度が濃くなった場合や高温時期に、果実に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度を厳守し、高温時の散布はさけてください。なお、普通温州以外では幼果期及び果実肥大期の散布はできるかぎりさけ、特に所定の高濃度での散布はさけてください。
- 日本なしに使用する場合、果実に薬害を生じるおそれがあるので使用濃度を厳守し、特に幼果期における散布はさけてください。
- ホップに使用する場合、穂果に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度を厳守してください。
- おうとうに使用する場合、果実に薬害を生じるおそれがあるので、果実に散布する場合は所定範囲内の低濃度で使用し、特に果実黄化期における散布はさけてください。
- 容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

- うどんこ病に使用する場合、発病初期に散布してください。発病後ならびに急速な病勢の進展時は5~7日程度の間隔で連続2回散布や他剤とのローテーション散布をしてください。
- 果菜類で使用する場合、散布液が溜まるような状態では、薬害が発生することがあるので、薬液の乾きやすい時に、所定範囲内の低濃度で使用してください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。

貯蔵上の注意事項

- 火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
- 低温期には凝固することがありますが、融解後の成分に影響はありません。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

取扱い

製造:  OAT アグリオ株式会社
<https://www.oat-agrio.co.jp/>
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

販売:  石原バイオサイエンス株式会社
 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号
 ホームページ アドレス <https://ibj.iskweb.co.jp>

コールセンター
 0120-210-928
 (9:00~12:00・13:00~17:00 土日・祝日を除く)