

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

【適用拡大の概要】

適用拡大の概要

＜使用時期の変更＞

- ・作物名「はなやさい類」の適用病害虫名「黒すす病」、使用方法「灌注」の使用時期を「育苗期後半～定植当日」に変更する。

＜作物名の追加＞

- ・作物名「なばな類」を追加する。

＜作物名の変更＞

- ・作物名「さやえんどう」を削除し、作物名「豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く)」を「豆類(未成熟)」に変更する。

＜適用病害虫名の追加＞

- ・作物名「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」、「豆類(未成熟)」に適用病害虫名「うどんこ病(だいず、さやえんどう)」、「褐紋病(さやえんどう)」を追加する。
- ・作物名「にら」に適用病害虫名「褐色葉枯病」を追加する。
- ・作物名「アスパラガス」に適用病害虫名「褐斑病」を追加する。

＜使用方法の追加＞

- ・作物名「アスパラガス」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
		20倍	2.0L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
	菌核病 黒すす病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
なばな類	菌核病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内、散布は2回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L) 当り0.5L	定植当日	1回	灌注	

次ページに続く

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、 <u>豆類(未成熟)</u>	菌核病 灰色かび病 <u>うどんこ病(だ いず、さやえん どう)</u> <u>褐紋病(さやえ んどう)</u>	2000~ 4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	3回 以内
にら	白斑葉枯病	2000~ 4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	3回 以内
	白絹病 <u>褐色葉枯病</u>	2000倍					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 <u>褐斑病</u>	2000倍	100~700L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	3回 以内
		8倍	1.6L/10a			<u>無人航空機 による散布</u>	
		10倍	2.0L/10a				
		16倍	3.2L/10a				
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または、ペー パーホット1冊(約 30×60cm、使用 土壌約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注及び浸漬は合計1回 以内)
		25~50倍	-	定植直前	5~10分間苗 根部浸漬		
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000~ 4000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000倍					
	黒斑病 葉枯病 さび病	20倍					
		25倍	2.0L/10a				
		40倍	3.2L/10a				

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

以下のとおり変更する。

- ・みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。
また、使用后14日間は入水しないこと。