

ランマンフロアブル
(シアゾファミド水和剤)

登録番号: 第20624号

適用拡大の概要

<希釈倍数、使用液量の追加>

・作物名「ばれいしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に希釈倍数「16倍」、使用液量「1.6L/10a」を追加する。

<使用方法の追加>

・作物名「さといも」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
・作物名「キャベツ」の適用病害虫名「べと病、ピシウム腐敗病」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「キャベツ」のシアゾファミドを含む農薬の総使用回数を「6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計4回以内)」に変更する。
(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内	
		375倍	25L/10a					
		600倍	40L/10a					
		32倍	3.2L/10a			無人航空機による散布		
		<u>16倍</u>	<u>1.6L/10a</u>					
さといも	疫病	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
		32倍	3.2L/10a			<u>無人航空機による散布</u>		
		16倍	1.6L/10a					
キャベツ	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L)当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	<u>6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計4回以内)</u>	
		2000倍	250ml/株	収穫14日前まで		株元灌注		
	べと病 ピシウム腐敗病	2000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	4回以内	散布		
			32倍			3.2L/10a		<u>無人航空機による散布</u>
			16倍			1.6L/10a		

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし