

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<作物名の追加>

- ・作物名「らっきょう」を追加する。

<適用病害虫名の追加>

- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「軟腐病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを 含む農薬の 総使用回数
<u>らっきょう</u>	灰色かび病	1000～2000 倍	100～ 300L/10a	収穫14日前 まで	5回以内	散布	5回以内
ばれいしょ	疫病	500倍	25L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は1 回以内、植付前 の土壌混和及び 植付時の植溝散 布は合計1回以 内、植付後の散 布は4回以内)
		1000～2000 倍	100～ 300L/10a				
	菌核病						
	夏疫病	2000倍					
	<u>軟腐病</u>	1000倍					
	そうか病	100倍	—	植付前	1回	種いも 瞬間浸漬	

作物名	適用 病害虫名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを 含む農薬の 総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病	400～ 600ml/10a	100～ 200L/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1 回以内、植付前 の土壌混和及び 植付時の植溝散 布は合計1回以 内、植付後の散 布は4回以内)
	粉状そうか病 そうか病	200ml/10a	20L/10a	植付時	1回	植溝散布	

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし