



適用拡大

とうもろこし
飼料用とうもろこし(子実)
だいこん、えだまめ
だいず、さといも
/ 無人航空機散布



〈写真はイメージです〉

害虫防除へ パワー全開!!



殺虫剤

アクセル[®] プロアブル

——— 葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く! ———



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



タマナギンウワバ



コナガ



トマトキバガ



キスジノミハムシ



ヨツモンカメノコハムシ



カブラハバチ



ゴマダラカミキリ



クビアカツヤカミキリ

適用作物

- | | | |
|------------|--------------|------------|
| ● うめ | ● ブロッコリー | ● なす |
| ● かんきつ | ● カリフラワー | ● 食用ミニバラ |
| ● キウイフルーツ | ● アスパラガス | ● かんしょ |
| ● もも類 | ● ねぎ | ● さといも |
| ● すもも | ● えだまめ | ● かぶ |
| ● キャベツ | ● だいず | ● ごぼう |
| ● はくさい | ● とうもろこし | ● しょうが |
| ● レタス | ● 飼料用 | ● だいこん |
| ● 非結球レタス | ● とうもろこし(子実) | ● にんじん |
| ● 非結球あぶらな科 | ● トマト | ● 花き類・観葉植物 |
| ● 葉菜類 | ● ミニトマト | ● 樹木類 |
| ● ほうれんそう | ● ビーマン | ● たばこ |



特長 1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効！ 2 害虫からの食害を停止させます！ 3 ローテーション防除に活用しやすい！

■適用病害虫および使用方法 が2025年4月に適用拡大になりました。 <2025年4月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内	
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ、ミカンナガタムシ	1000~4000倍 1000~2000倍	200~700ℓ/10a			散布		
	ゴマダラカミキリ、アゲハ類、ヨモギエダシャク クワノミハムシ、ミカンナガタムシ	12倍 15倍 24倍	4~8ℓ/10a 8~10ℓ/10a 10~16ℓ/10a			※2		
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a		2回以内	散布	4回以内 (樹幹散布は2回以内、 散布は2回以内)	
もも類 すもも	クビアカツヤカミキリ	100~200倍	5~200ℓ/10a			樹幹散布		
うめ	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a			散布		
	ケシクスイ類	1000~2000倍				全面土壌散布		
とうもろこし、 飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a		3回以内	散布	3回以内	
	ツマジロクサヨトウ	16倍 1000倍 16倍	1.6~3.2ℓ/10a 100~300ℓ/10a 3.2ℓ/10a			※2 散布 ※2		
アスパラガス	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~800ℓ/10a		3回以内		3回以内	
ごぼう	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍						
トマト、ミニトマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a					散布
	トマトキバガ	1000倍						
ピーマン	オオタバコガ	1000~2000倍						
なす	オオタバコガ、ニジュウヤホシデントウ、ハスモンヨトウ							
にんじん	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍			2回以内	※2	2回以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8倍 10倍 16倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a					
		1000倍						
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a		3回以内	散布	3回以内	
キャベツ	ウリハムシモドキ	1000倍						
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ(類)	1000~2000倍	8倍 10倍 16倍			1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a		
	はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ(類)	8倍 10倍 16倍			1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a		
コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ(類)		1000倍 1000~2000倍	100~300ℓ/10a	散布				
レタス		ハスモンヨトウ、オオタバコガ	8倍 10倍 16倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	※2			
					散布			
	非結球レタス		ハスモンヨトウ、オオタバコガ	8倍 10倍 16倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	※2		
カリフラワー		コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ コナガ		1000倍 1000~2000倍 1000倍	100~300ℓ/10a	散布		
				ブロッコリー	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	8倍 10倍 16倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	※2
	非結球あぶらな科葉菜類		コナガ、キスジノミハムシ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ(類)			1000倍 2000倍 1000倍 1000~2000倍	100~300ℓ/10a	散布
だいこん		キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ(類)				8倍 10倍 16倍 20倍	0.8ℓ/10a 1.0ℓ/10a 1.6ℓ/10a 2.0ℓ/10a	※2
				かぶ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍 1000~2000倍	100~300ℓ/10a	散布
	えだまめ だいず		ハスモンヨトウ			8倍 10倍 16倍	0.8~1.6ℓ/10a 1.0~2.0ℓ/10a 1.6~3.2ℓ/10a	※2
						フタスジヒメハムシ	1000倍 8倍 10倍 16倍	100~300ℓ/10a 1.6ℓ/10a 2.0ℓ/10a 3.2ℓ/10a
しょうが		ハスモンヨトウ、アワノメイガ		1000~2000倍 16倍	100~300ℓ/10a 3.2ℓ/10a		散布	
				かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、ヨツモンカメノコハムシ		10~16倍	0.8~1.6ℓ/10a
	さといも		ハスモンヨトウ				1000~2000倍 10倍 20倍	100~300ℓ/10a 1.0~1.6ℓ/10a 2.0~3.2ℓ/10a
食用ミニバラ		オオタバコガ オオタバコガ、シロイチモジヨトウ オオタバコガ		1000倍 1000~2000倍 1000倍	100~300ℓ/10a	散布		
				さくら	ケムシ類	1000~4000倍	200~700ℓ/10a	発生初期
	クビアカツヤカミキリ		1000倍 200倍 100倍			200~700ℓ/10a 5~200ℓ/10a —	成虫発生直前 ~成虫発生期	
たばこ	ヨトウムシ タバコアオムシ	1000~2000倍 2000倍	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	

■使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- うめに全面土壌散布する場合は、適度な降雨等により土壌に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさせていただきます。
- すももに樹幹散布で使用する場合は、散布液が果実にかかる汚れを生じるおそれがあるので果実からからないように十分注意してください。
- みずけ(水掛菜)、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は水しないてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われていることを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の養蜂家からないようにしてください。
- 無人航空機による散布は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。