

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

【適用拡大の概要】

適用拡大の概要

＜適用病害虫名の追加＞

- ・作物名「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」、「豆類(未成熟)」に適用病害虫名「褐色輪紋病(だいず)」、「さび病(あずき、さやえんどう)」を追加する。
- ・作物名「はなやさい類」に適用病害虫名「苗立枯病(リゾクトニア菌)」を追加する。
- ・作物名「レタス」、「非結球レタス」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- ・作物名「りんどう」に適用病害虫名「褐斑病」、「葉枯病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、 豆類(未成熟)	菌核病 灰色かび病 うどんこ病(だいず、さやえんどう) 褐紋病(さやえんどう)	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	褐色輪紋病(だいず) さび病(あずき、さやえんどう)	2000倍					
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
		20倍	2.0L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	

次ページに続く



「石原の農薬登録情報」

(令和7年7月9日付)

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
レタス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病 すそ枯病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
	白絹病	2000倍					
	菌核病 すそ枯病 白絹病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、パーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
	菌核病 灰色かび病	16倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	
		20倍	2.0L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
りんどう	黒斑病 花腐菌核病	2000倍	100～300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病 葉枯病			発病前			
	うどんこ病	4000倍		発病初期			

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞なし