

アーザラン[®]液剤なら 頑固なオヒシバも しっかり枯らせます!



運動場
公園
庭園

水田畦畔

堤とう
のり面

宅地
道路
駐車場

アーザラン[®]液剤


[®]は登録商標

【特長】

- 非農耕地・水田畦畔の雑草を、**イネ科から広葉まで**幅広く防除します。
- **根まで**しっかり枯らすので、極めて**長い期間抑草**できます。
- **薬量選択性**なので、スギナなどの頑固な雑草も高濃度で枯らせます。
- 植物体内や土壌中で速やかに分解されるので、**環境に優しい**除草剤です。

枯れ残る頑固なオヒシバを、根までしっかり枯らせます!

■試験成績紹介(出穂前処理)



【試験概要】石原バイオサイエンス(株)社内自主試験(2024年) ■試験場所:千葉県山武市 ■試験規模:φ240mm×深さ133mmのポット
 ■散布時期:8月28日に蓄圧式噴霧器にて雑草茎葉散布。展着剤は不加用。■供試薬剤:アーザラン液剤1000mℓ/10a(散布水量100ℓ/10a) ■処理時期雑草の様子:出穂前(草丈約20cm)

■適用雑草と使用方法(抜粋)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用方法	適用 地帯	本剤およびアシュラムを 含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	一年生雑草	雑草生育期	1000~2000mℓ /10a	25~200ℓ /10a	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	—	3回以内
		多年生広葉雑草		2000~3000mℓ /10a				
		多年生イネ科雑草		3000~5000mℓ /10a				
		クズ		5000mℓ /10a				
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 キク科、タデ科の多年生雑草		1500~3000mℓ /10a		雑草茎葉散布		

■上手な使い方(樹木等の場合)

- 散布時期:草丈20cm以下
- 薬量:1000mℓ/10a ●希釈水量:100ℓ/10a

■希釈早見表(100倍希釈の場合)

散布面積	使用量	希釈水量
1000㎡	333坪	1000mℓ 100ℓ
666㎡	200坪	666mℓ 66ℓ
333㎡	100坪	333mℓ 33ℓ
100㎡	33坪	100mℓ 10ℓ
33㎡	10坪	33mℓ 3ℓ
10㎡	3.3坪	10mℓ 1ℓ

■効果・薬害等の注意事項(抜粋)

一般的注意事項

- 雑草の発生程度により、許容薬量内で使用量を増減してください。
- 吸収・移行性の高い薬剤ですが、局所散布および群生地散布の場合には必要に応じて展着剤を加用し、よく付着するように十分散布してください。
- ヒユ科、カヤツリグサ科雑草およびザクロソウ、ツルクサ、ギョウギシバに対して効果が劣るので、これらの雑草の優占ほ場での使用はさけてください。
- 本剤は遅効性で、効果が現れるまでにかなりの時間を要し、散布時期が遅れると効果が劣るので、時期を失ないように散布してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

畦畔に使用する場合

- のり面へは散布しないでください。
- 稲などの農作物にかからないように圧力を下げた噴霧機などで十分注意して散布してください。
- 薬剤が水田に飛散、流入しないように散布してください。

公園、庭園等で使用する場合

- 石を汚染することがあるので、霊園、墓地等では使用しないでください。
- 散布薬液の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生じないように、十分注意して散布してください。
- 水源池等に飛散、流入しないよう十分注意してください。
- 激しい降雨が予想される場合は、使用しないでください。

※本内容は2025年9月時点での知見に基づいて作成しています。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

