

水稻用一発除草剤



1キロ粒剤 ジャンボ®

「フルスコア®」は石原産業(株)の登録商標。「ジャンボ®」は(公財)日本植物調節剤研究協会の登録商標。

新規成分「ランコトリオン」が  
SU抵抗性雑草にも優れた効果

2成分で幅広い雑草に優れた効果を奏ぐる  
「フルスコアZ」誕生



1キロ粒剤



ジャンボ



石原バイオサイエンス株式会社

## 適用雑草と使用方法

有効成分:プロピリスルフロン…0.90% ランコトリオンナトリウム塩…2.1%

| 作物名           | 適用雑草名   | 使用時期                         | 10アール<br>当り使用量 | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法                     |
|---------------|---|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1<br>キロ<br>粒剤 | 移植<br>水稻 一年生雑草 及び 多年生広葉雑草<br>エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後5日～ノビエ3.5葉期<br>但し収穫60日前まで | 1kg            | 1回          | 湛水散布<br>又は<br>無人航空機による散布 |
|               | 直播<br>水稻 一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ<br>ウリカワ、ヒルムシロ、セリ     | 稻2葉期～ノビエ3.5葉期<br>但し収穫60日前まで  |                |             |                          |

各有効成分を含む農薬の総使用回数:プロピリスルフロン…2回以内 ランコトリオンナトリウム塩…1回

有効成分:プロピリスルフロン…3.0% ランコトリオンナトリウム塩…7.0%

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用時期                         | 10アール<br>当り使用量            | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法                        |
|------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| ジャンボ | 移植<br>水稻 一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ<br>ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ<br>コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植後5日～ノビエ3.5葉期<br>但し収穫60日前まで | 小包装<br>(パック)<br>10個(300g) | 1回          | 水田に小包装<br>(パック)のまま<br>投げ入れる |
|      | 直播<br>水稻 一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ<br>ウリカワ、ヒルムシロ、セリ  | 稻2葉期～ノビエ3.5葉期<br>但し収穫60日前まで  |                           |             |                             |

各有効成分を含む農薬の総使用回数:プロピリスルフロン…2回以内 ランコトリオンナトリウム塩…1回

## 使用のポイント


### ①代かき

田面が均一になるよう、ていねいに代かきをしてください。  
未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。



### ②湛水深

湛水散布または無人航空機による散布時は水の出入りを止めて、湛水のまま田面に均一に散布してください。(1キロ粒剤)  
散布時は水の出入りを止めて5～6cmの水深にしてください。  
(ジャンボ)



### ③浮遊物(ジャンボ)

藻類・表層はく離などの浮遊物が多い条件下では、拡散が不十分となり部分的な効果不足や薬害が生じることがあるので、使用しないでください。



### ④水管理が重要!

散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(3～5cm)を保ち、田面を露出させないようにしてください。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。



### ⑤降雨

散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下があるので使用しないでください。

## 使用上の注意事項

(1)本剤の使用時期は、移植水稻に使用する場合はノビエの3.5葉期まで、直播水稻に使用する場合は稻の2葉期からノビエの3.5葉期までなので、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがるので、必ず適期に散布してください。各種雑草の散布適期は次の通りです。

### 〈散布適期〉

|                      | 1キロ粒剤      |      | ジャンボ       |      |
|----------------------|------------|------|------------|------|
|                      | 移植水稻       | 直播水稻 | 移植水稻       | 直播水稻 |
| ホタルイ                 | 3葉期まで      |      | 3葉期まで      |      |
| ヘラオモダカ               | 3葉期まで      | —    | 3葉期まで      | —    |
| ミズガヤツリ               | 3葉期まで      |      | 3葉期まで      |      |
| ウリカワ                 | 3葉期まで      |      | 3葉期まで      |      |
| ヒルムシロ                | 発生期まで      |      | 発生期まで      |      |
| セリ                   | 再生前～再生始期まで |      | 再生前～再生始期まで |      |
| エゾノサヤヌカグサ            | 2葉期まで      | —    | 2葉期まで      | —    |
| オモダカ                 | 矢じり葉1葉期まで  | —    | 矢じり葉1葉期まで  | —    |
| クログワイ                | 草丈15cmまで   | —    | 草丈15cmまで   | —    |
| コウキヤガラ               | 草丈15cmまで   | —    | 草丈15cmまで   | —    |
| シズイ                  | 草丈10cmまで   | —    | —          | —    |
| アオミドロ・藻類<br>による表層はく離 | 発生前まで      | —    | 発生前まで      | —    |

(2)シズイ(1キロ粒剤)、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、生育段階によって効果にフレがるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用してください。

(3)前処理剤との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、使用時期を失しないように適期に散布してください。



(4)次のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用しないでください。

・砂質土壤の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)

・軟弱な苗を移植した水田

・極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田

(5)稻の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので使用しないでください。

(6)散布後の低温および急激な気温の上昇により薬害が発生するおそれがあるので、十分注意してください。

(7)散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあります、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。

(8)活着遅延を生じる異常低温が予測される時は、初期生育の抑制等が生じるおそれがあるので、このような条件下での使用に際しては、県の防除指針に基づき関係機関の指導を受けるようにしてください。

(9)いぐさ、れんこん、せり、くわい等の生育を阻害するおそれがあるので、隣接田で使用する場合には、十分注意してください。

(10)いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。

(11)散布田の田面水を他の作物に灌水しないでください。

(12)使用方法等を厳守してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

### 〈1キロ粒剤の使用上の注意事項〉

無人航空機による散布の注意事項は、商品ラベルを参照してください。

### 〈ジャンボの使用上の注意事項〉

(1)小包装(パック)のまま10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。

(2)パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本印刷物は2026年1月時点での知見に基づいて作成しています。

