

カブリダニ類への各種薬剤（殺菌剤ほか）の影響表

A	天敵に影響が小さい剤。いつでもバンカーシートとの併用が可。
A'	A' は2週連続散布不可。
B	天敵にやや影響がある剤。 ミヤコバンカー：バンカシート設置前または設置後2週間以内であれば併用可。 スワルバンカーロング：バンカーシート設置前または設置1週間以内であれば併用可。
C1	天敵に影響がある剤。バンカーシート設置1週間前まで使用可能。以降は使用不可。
C2	天敵に影響がある剤。バンカーシート設置3週間前まで使用可能。以降は使用不可。
C3	天敵に影響がある剤。バンカーシート設置6週間前まで使用可能。以降は使用不可。
C4	天敵に影響がある剤。バンカーシートとの併用は不可。

カブリダニ類への殺菌剤の影響

商品名	薬剤系統	FRACコード	試験方法	最新総合評価	
				ミヤコバンカー	スワルバンカーロング
ICボルドー66D	銅	M1	散布	—	A
Zボルドー	銅	M1	散布	A	A'
アフエットフロアブル	SDHI	7	散布	A	A
アミスター20フロアブル	QoI	11	散布	A	A
アリエッティ水和剤	有機リン系	P7	散布	A	A
アントラコール顆粒水和剤	ジチオカーバメート	M3	散布	A'	A'
アンビルフロアブル	DMI	3	散布	A	A
硫黄粉剤	硫黄	M2	粉剤散布	A'	B
イオウフロアブル	硫黄	M2	散布	A	A
インダーフロアブル	DMI	3	散布	A	A
園芸ボルドー、イデクリーン	硫黄/銅	M2/M1	散布	A	A
オーソサイド水和剤80	フタルイミド	M4	散布	A	A
オラクル顆粒水和剤	QoI	21	散布	A'	A
オンリーワンフロアブル	DMI	3	散布	A	A
カスミンボルドー	ヘキソピラノシル抗生物質/銅	24/M1	散布	A	A
カナメフロアブル	SDHI	7	散布	A	A
カリグリーン	炭酸水素カリウム	NC	散布	A	A
カンタスドライフロアブル	SDHI	7	散布	A	A
キノンドーフロアブル	銅	M1	散布	A	A
クミガードSC	銅	M1	散布	A	A
クロスアウトフロアブル	アリルフェニルケトン	50	散布	A	A
ゲッター水和剤	N-フェニルカーバメート/MBC	10/1	散布	C3	C3
ケンジャフロアブル	SDHI	7	散布	A	A
コサイド3000	銅	M1	散布	—	A
サプロール乳剤	DMI	3	散布	B	B
サルバトーレME液剤	DMI	3	散布	A	A
ザンプロDMフロアブル	QoSI/CAA	45/40	散布	A	—
サンヨール	銅	M1	散布	B	A
サンリット水和剤	DMI	3	散布	A	A
ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム/銅	NC/M1	散布	A	A
ジマンダイセン水和剤	ジチオカーバメート	M3	散布	B	C4
ジャストフィットフロアブル	ベンズアミド/CAA	4/40	散布	A	A
ショウチノスケフロアブル	チアゾリジン/アニリノピリミジン	U13/9	散布	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
スクレアフロアブル	QoI	11	散布	A	A
スコア顆粒水和剤	DMI	3	散布	A	—
ストロビーフロアブル	QoI	11	散布	A	A
スミレックス水和剤	ジカルボキシイミド	2	散布	A	A
セイビアーフロアブル20	フェニルピロール	12	散布	A	A
ゾーバックエンテクタSE	QiI/その他	21/49	散布	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾
ダコニール1000	クロロニトリル	M5	散布	A	A'
チルト乳剤25	DMI	3	散布	A	—
デランフロアブル	キノン	M9	散布	A	A
ドーシャスフロアブル	QiI/クロロニトリル	21/M5	散布	A	A
トップジンM水和剤	MBC	1	散布	C3	C3
トリフミン水和剤	DMI	3	散布	A	A
トレノックスフロアブル	ジチオカーバメート	M3	散布	A'	—
ナリアWDG	QoI/SDHI	11/7	散布	A	A
ネクスターフロアブル	SDHI	7	散布	A	A
パスワード顆粒水和剤	その他	17	散布	A	A
パレード20フロアブル	SDHI	7	散布	A	A
ビクシオDF	その他	17	散布	A	—
ビシロックスフロアブル	テトラゾリルオキシム系	U17	散布	A	A
ピリカット乳剤	ピリミジニアミン	39	散布	C4	—
ファンタジスタ顆粒水和剤	QoI	11	散布	A	A
フェスティバル水和剤	CAA	40	散布	A	A
フジドーLフロアブル	銅	M1	散布	—	A
フセキワイドフロアブル	ビスグアニジン/ピリダジン類	M7/53	散布	A	A
フリントフロアブル25	QoI	11	散布	A	A
フルピカフロアブル	アニリノピリミジン	9	散布	A	A
プロブラッド液剤	その他	BM1	散布	A	A
プロポーズ顆粒水和剤	CAA/クロロニトリル	40/M5	散布	A	A
フロンサイドSC	その他	29	散布	A	A
ベランティーフロアブル	DMI	3	散布	A	A
バルコート水和剤	ビスグアニジン	M7	散布	A	A
ペンコゼブ水和剤	ジチオカーバメート	M3	散布	B	C4

- 1) ガッテン乳剤とフルピカフロアブルの試験結果からの推定。ガッテン乳剤はミヤコA、スワルA。
2) ゾーバックエニケードとライメイフロアブルの試験結果からの推定。ゾーバックエニケードはミヤコA、スワルA。

カブリダニ類への殺菌剤の影響

商品名	薬剤系統	FRACコード	試験方法	最新総合評価	
				ミヤコバンカー	スワルバンカーロング
ベンレート水和剤	MBC	1	散布	C4*	C3
ホライズンドライフロアブル	その他/QoI	27/11	散布	A'	A'
ポリオキシシナール水溶剤	ポリオキシシ	19	散布	B	B
ポリオキシシナール水和剤	ポリオキシシ	19	散布	B	B
マネージ乳剤	DMI	3	散布	A'	—
ミギワ20フロアブル	DHODHI	52	散布	A	A
モレスタン水和剤/バルミノフロアブル	キノキサリン	M10	散布	C2	C3
ユニックス顆粒水和剤47	アニリノピリミジン	9	散布	A	A
ライメイフロアブル	QiI	21	散布	A	A
ラミック顆粒水和剤	ビスグアニジン/その他	M7/50	散布	A	A
ラリー乳剤	DMI	3	散布	A	A'
ランマンフロアブル	QiI	21	散布	A	A
リゾレックス水和剤	芳香族炭化水素	14	散布	B	A'
リドミルゴールドMZ	ジチオカーバメート/PA殺菌剤	M3/4	散布	B	B
レーバスフロアブル	CAA	40	散布	A	A
ロブラール水和剤	ジカルボキシイミド	2	散布	A	A
ロンセラーフロアブル	SDHI	7	散布	A	A

*みょうがにベンレート水和剤を使用する場合はバンカーシート設置2週間前まで使用可能。以降は使用不可。

カブリダニ類への展着剤の影響

商品名		試験方法	最新総合評価	
			ミヤコバンカー	スワルバンカーロング
アビオンE	展着剤	散布	A	A
アプローチBI	展着剤	散布	A'	A
クミテン	展着剤	散布	A	A
サブマージ	展着剤	散布	B	B
スカッシュ	展着剤	散布	A	A
ダイコート	展着剤	散布	A	A
ドライバー	展着剤	散布	A	A
ニーズ	展着剤	散布	A	A
ネオエステリン	展着剤	散布	A	A
ハイテンパワー	展着剤	散布	A	A
ブレイクスルー	展着剤	散布	A	A
マイリノー	展着剤	散布	A	A
まくびか	展着剤	散布	A	A(10000倍)
ミックスパワー	展着剤	散布	A	A
ラビデン3S	展着剤	散布	A	A
ワイドコート	展着剤	散布	A	A

カブリダニ類への葉面散布剤の影響

商品名		試験方法	最新総合評価	
			ミヤコバンカー	スワルバンカーロング
アミノ酸酵素液	葉面散布剤	散布	—	A
彩葉コート	葉面散布剤	散布	A'	—
光合成細菌	葉面散布剤	散布	—	A
ダーウィンFC100	葉面散布剤	散布	—	A
トウゲン	葉面散布剤	散布	A	A
トレイン	葉面散布剤	散布	—	A
ハイプログリーン	葉面散布剤	散布	—	A
メリット青	葉面散布剤	散布	A	—
メリット赤	葉面散布剤	散布	A	A
メリット黄	葉面散布剤	散布	A	—

カブリダニ類へのその他薬剤の影響

商品名		試験方法	最新総合評価	
			ミヤコバンカー	スワルバンカーロング
フィガロン	その他	散布	—	A
クレフノン	その他	散布	A	—

本資料はミヤコバンカー、スワルバンカーロングをより有効に使用するために、主要な化学農業の影響をW天敵、JA全農と石原産業が実施した独自試験およびBiobest社の知見等を含めてとりまとめたものです。今後必要に応じて改訂されます。
表中の影響の程度はあくまでも目安であり、気象条件(温度、降雨、紫外線量など)で変化します。
化学農業の併用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

●使用前にラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は適切に処理してください。

カブリダニ類への各種薬剤（殺虫剤）の影響表

A	天敵に影響が小さい剤。いつでもバンカーシートとの併用が可。 A' は2週連続散布不可。 天敵にやや影響がある剤。 ミヤコバンカー：バンカーシート設置前または設置後2週間以内であれば併用可。 スワルバンカーロング：バンカーシート設置前または設置1週間以内であれば併用可。 天敵に影響がある剤。バンカーシート設置1週間前まで使用可能。以降は使用不可。 天敵に影響がある剤。バンカーシート設置3週間前まで使用可能。以降は使用不可。 天敵に影響がある剤。バンカーシート設置6週間前まで使用可能。以降は使用不可。 天敵に影響がある剤。バンカーシートとの併用は不可。
A'	
B	
C1	
C2	
C3	
C4	

カブリダニ類への殺虫剤の影響

商品名	薬剤系統	IRAC コード	試験 方法	最新総合評価	
				ミヤコ バンカー	スワル バンカー ロング
アーデントフロアブル	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C2
アーデント水和剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C2
アカリタッチ乳剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	A'
アクセルフロアブル	その他	22B	散布	A	A
アクタラ顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	C2	C1
アグリメック	マクロライド系	6	散布	C1	C1
アタブロン乳剤	IGR	15	散布	A'	A
アディオンフロアブル	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
アディオン乳剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
アドマイヤー1粒剤	ネオニコチノイド系	4A	粒剤	A	A
アドマイヤーフロアブル	ネオニコチノイド系	4A	散布	C1	C1
アニキ乳剤	マクロライド系	6	散布	C1	C1
アフーム乳剤	マクロライド系	6	散布	C1	C1
アブロードフロアブル	IGR	16	散布	A	A'
アベンジャーフロアブル	その他	34	散布	A	A
ウララDF	フロニカミド	29	散布	A	A
エクシレルSE	ジアミド系	28	散布	A	A
エコピタ液剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
エフィコンSL	ピリダジンピラゾールカルボキサミド	36	散布	A	A
オマイト水和剤	殺ダニ剤	12C	散布	B	C4
オリオン水和剤40	カーバメート系	1A	散布	C4	A
オルトラン水和剤	有機リン系	1B	散布	C2	C4
オレート液剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
ガードホープ液剤	有機リン系	1B	灌注	A	B
カスケード乳剤	IGR	15	散布	A'	A
ガゼット粒剤	カーバメート系	1A	粒剤	A	—
カネマイトフロアブル	殺ダニ剤	20B	散布	A	A
グレーシア乳剤	イソオキサゾリン系	30	散布	C4	C4
グレーシアフロアブル	イソオキサゾリン系	30	散布	C4	C4
コテツフロアブル	その他	13	散布	C2	C2
コルト顆粒水和剤	ピリジンアゾメチン誘導体	9B	散布	A	A
コロマイト乳剤	マクロライド系	6	散布	C2	C1
サフオイル乳剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	A'
サムコルフロアブル10	ジアミド系	28	散布	A	A
サンクリスタル乳剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
サンマイト水和剤	殺ダニ剤	21A	散布	C4	C4
サンマイトフロアブル	殺ダニ剤	21A	散布	C4	C4
ジェイエース水溶剤	有機リン系	1B	散布	C2	C4
スカウトフロアブル	ピレスロイド系	3A	散布	C4	—
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	A	A
スターマイトフロアブル	殺ダニ剤	25A	散布	A	A
スピノエース顆粒水和剤	スピノシン系	5	散布	C1	C2
スピノエースフロアブル	スピノシン系	5	散布	C1	C2
スミチオン乳剤	有機リン系	1B	散布	C4	C4
スミチオン水和剤40	有機リン系	1B	散布	C4	C4
セフィーナDC	ピロペン系	9D	散布	—	A
ゼンターリ顆粒水和剤	BT	11A	散布	A	A
ダイアジノン水和剤34	有機リン系	1B	散布	C1	C4
ダイアジノン乳剤40	有機リン系	1B	散布	C1	C4
ダニエモンフロアブル	殺ダニ剤	23	散布	B	B
ダニオーテフロアブル	殺ダニ剤	33	散布	A	A
ダニゲッターフロアブル	殺ダニ剤	23	散布	B	B
ダニコングフロアブル	殺ダニ剤	25B	散布	A	A
ダニサラバフロアブル	殺ダニ剤	25A	散布	A	A
ダニトロンフロアブル	殺ダニ剤	21A	散布	B	B
ダニメツフロアブル	気門封鎖剤/IGR殺ダニ剤	-/10B	散布	C4	C4
ダブルシューター	気門封鎖剤/スピノシン系	-/5	散布	C1	C1
ダブルフェースフロアブル	殺ダニ剤/殺ダニ剤	25B/21A	散布	A'	C2
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	B	B

2016年5月作成 2026年9月改定

商品名	薬剤系統	IRAC コード	試験 方法	最新総合評価	
				ミヤコ バンカー	スワル バンカー ロング
チェス顆粒水和剤	ピリジンアゾメチン誘導体	9B	散布	A	A
ディアナSC	スピノシン系	5	散布	C2	C2
ディアナWDG	スピノシン系	5	散布	C2	C2
テッパン液剤	ジアミド系	28	散布	A	A
デミリン水和剤	IGR	15	散布	A	A
テルスター水和剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
テルスターフロアブル	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
トクチオン乳剤	有機リン系	1B	散布	C4	C4
トランスフォームフロアブル	スルホキシイミン	4C	散布	A	A
トリガード液剤（灌注）	IGR	17	灌注	A	—
トリガード液剤	IGR	17	散布	B	B
トルネードエースDF	その他	22A	散布	A	A
トレボン乳剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	B
ニッソラン水和剤	IGR殺ダニ剤	10A	散布	A	A
ネマキック粒剤	有機リン系	1B	粒剤	—	A
ネマトリンエース粒剤	有機リン系	1B	粒剤	A	A
粘着くん液剤	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
ノーモルト乳剤	IGR	15	散布	A	A
ハーベストオイル	気門封鎖剤	-	散布	B	C1
バイスロイドEW	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
バイデートL粒剤	カーバメート系	1A	粒剤	A	—
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
パダンSG水溶剤	ネライストキシシン系	14	散布	C3	C2
ハチハチフロアブル	METI	21A	散布	C2	C3
ハチハチ乳剤	METI	21A	散布	C2	C3
バリアード顆粒水和剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	A	A
バロックフロアブル	IGR殺ダニ剤	10B	散布	C2	C2
ビタイチ	気門封鎖剤	-	散布	A'	A'
ピラニカEW	METI	21A	散布	C1	C4
ファインセーブフロアブル	その他	34	散布	A	A
ファルコンフロアブル	IGR	18	散布	A	A
フーモン	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
フェニックスフロアブル	ジアミド系	28	散布	A	A
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	28	散布	A	A
フォース粒剤	ピレスロイド系	3A	粒剤	C4	—
ブリロッソ粒剤オメガ	ジアミド系	28	粒剤	A	A
ブレオフロアブル	その他	UN	散布	A	A
ブレバソnfフロアブル5	ジアミド系	28	散布	A	A
プロフレアSC	メタジアミド系	30	散布	—	C4
ベストガード水溶剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	A	A'
ベネビア0D	ジアミド系	28	散布	A	A
バリマークSC	ジアミド系	28	灌注	A	A
ペンタック水和剤	殺ダニ剤	-	散布	C4	C4
マイトコーネフロアブル	殺ダニ剤	20D	散布	A	B
マッチ乳剤	IGR	15	散布	A	A
マトリックフロアブル	IGR	18	散布	A	—
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
マラソン乳剤	有機リン系	1B	散布	B	C4
ムシラップ	気門封鎖剤	-	散布	A'	B
メビウスフロアブル	マクロライド系/IGR殺ダニ剤	6/10B	散布	—	C4
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	4A	粒剤	A	—
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	4A	散布	A'	C2
モベントフロアブル	その他	23	散布	C2	C2
モベントフロアブル（灌注）	その他	23	灌注	C2	—
ヨーバルフロアブル	ジアミド系	28	散布	A	A
ラービnfフロアブル	カーバメート系	1A	散布	C4	B
ロディー水和剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
ロディー乳剤	ピレスロイド系	3A	散布	C4	C4
ロムダンフロアブル	IGR	18	散布	A	B

本資料はミヤコバンカー、スワルバンカーロングをより有効に使用するために、主要な化学農業の影響をW天敵、JA全農と石原産業が実施した独自試験およびBiobest社の知見等を含めてとりまとめたものです。今後必要に応じて改訂されます。
表中の影響の程度はあくまでも目安であり、気象条件（温度、降雨、紫外線量など）で変化します。
化学農業の併用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

●使用前にラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は適切に処理してください。